

آزمایش NIPT در موارد زیر قدرت تشخیص بالایی ندارد و امکان عدم جواب دهی و نتیجه کاذب

وجود دارد:

- ۱- خانم‌هایی با وزن بالاتر از ۱۱۰ کیلوگرم و  $BMI > 2.5$
- ۲- بارداری‌های چندقلو که یک قل از بین رفته و یا دوقلو که تنها یکی از جنین‌ها باقی مانده باشد.
- ۳- خانم‌هایی که تحت درمان با سلول‌های بنیادی یا ایمونوتراپی یا داروهای رقیق‌کننده از جمله هپارین و آسپیرین قرار گرفته‌اند.
- ۴- خانم‌هایی با سن بارداری کمتر از ۱۰ هفته
- ۵- خانم‌هایی با سن بالاتر از ۴۰ سال
- ۶- خانم‌هایی با سابقه بیماری سرطان و شیمی‌درمانی
- ۷- خانم‌هایی که دریافت‌کننده خون و یا عضو پیوندی بوده‌اند.
- ۸- خانم‌هایی با سابقه بیماری خودایمنی
- ۹- در صورتیکه نمونه ارسالی از طرف مرکز همولیز داشته باشد
- ۱۰- در صورتیکه نمونه ارسالی از طرف مرکز لخته باشد
- ۱۱- در صورتیکه نمونه ارسالی از طرف مرکز در لوله‌های غیر استاندارد گرفته شود.

چنانچه بیمار حائز هر کدام از موارد فوق باشد احتمال عدم جواب دهی تست NIPT، بالاست لذا فقط در صورتیکه بیمار یا آزمایشگاه ارسال‌کننده همچنان خواستار انجام تست باشند در صورت عدم جواب دهی هزینه عودت داده نمیشود.

## موارد خاص معیارهای رد نمونه

در موارد **low fetal fraction** و **high data noise** و **low read** در صورتیکه بیمار حائز شرایط بالا نباشد با ارسال نمونه جدید تست تکرار می شود. در این موارد چه در صورت جواب دهی و چه در صورت عدم جواب دهی (Nocall) تست هزینه یکبار آزمایش اخذ می گردد.

توجه داشته باشید تست NIPT یک آزمایش غربالگری بوده و در مواردی نیاز به تکرار نمونه گیری و یا تایید یک روش تشخیصی می باشد، لذا در خانم های با سن بارداری بیشتر از ۱۶ هفته ممکن است زمان کافی قبل از زمان قانونی سقط جنین ۱۸ هفته و ۶ روز وجود نداشته باشد. لذا در چنین مواردی هیچ مسئولیتی متوجه آزمایشگاه نخواهد بود.

اینجانب..... موارد ذکر شده را مطالعه کرده و با توجه به دارا بودن مورد..... رضایت خود را جهت انجام تست NIPT اعلام می دارم.

امضا و اثر انگشت خانم باردار:

امضا و اثر انگشت همسر: